

Efter fjernelse af en tand



Hvad kan du forvente,
når du har fået fjernet
en tand?

Hvad kan du spise?

Og hvad gør du, hvis
du får smerter?

Efter fjernelse af en tand

At få fjernet en tand kan give ubehag. I denne brochure kan du læse om, hvad du kan gøre, så generne bliver så små som muligt.

Hvad kan du forvente, når du har fået fjernet en tand?

At få fjernet en tand kan sammenlignes med en lille operation. Du skal derfor passe på og pleje såret, som er opstået i munden. Undertiden syr tandlægen såret for at holde sårkanterne sammen og fremme helingen.

Så længe lokalbedøvelsen virker, kan du let komme til at bide dig i læben, kinden eller tungen, så lad være med at spise, før bedøvelsen er væk.



At få fjernet en tand kan sammenlignes med en lille operation. ”

Der kan undertiden opstå smerter

De første par timer er mund og sår bedøvet, og det vil derfor ikke gøre ondt.

Når bedøvelsen er ophørt, kan du blive øm og få smerter. Du kan derfor med fordel tage smertestillende medicin, inden bedøvelsen er forsvundet. Spørg din tandlæge, hvad du skal tage og i hvor lang tid. Følg desuden medicinpakkens anbefalinger.

Har din tandlæge udleveret medicinen, skal tandlægens anvisninger følges.

Får du stærke smerter, bør du søge råd hos tandlægen. Måske er det nødvendigt med receptpligtig smertestillende medicin eller anden smertelindrende behandling. Der kan også være brug for en nærmere undersøgelse af såret.

Hævelse

Det er helt almindeligt, at kind og tandkød hæver, når du har fået fjernet en tand. Kolde omslag kan formindskede hævelsen. Læg en ispose eller et koldt, fugtigt håndklæde på kinden ud for det sted, hvor tanden er fjernet. Gør det et kvarter hver time de første par timer.

Nogle vil opleve, at kinden bliver lidt blågul. Det er helt normalt og vil fortage sig i løbet af 3-4 dage. Vokser hævelsen i mere end to dage efter fjernelse af tanden, bør du kontakte din tandlæge for kontrol.

Pas på såret

Når en tand er fjernet, skal såret have ro. Du skal derfor tage den med ro og undgå at være fysisk aktiv det første døgn efter tandudtrækningen. For megen aktivitet kan øge blodtrykket og resultere i blødninger.

Når du skal sove eller ligge ned, er det en god ide at ligge med hovedet højt det første døgn. Det letter trykket i såret.

Undgå at røre ved såret. Det gælder både med tunge, fingre, lommetørklæde og andet.

Lad være med at suge i såret. Undlad derfor også at bruge sugerør, når du drikker noget.

Mundskylning

Skyl ikke munden den dag, tanden er fjernet, og gør det under ingen omstændigheder de første to timer. Såret får ikke fred til at hele, så længe du skyller munden.

Dagen efter at tanden er fjernet, kan du skylle munden forsigtigt med lunkent vand eller klorhexidin 0,12% (kan købes på apoteket eller i Matas). Det nedsætter risikoen for infektion.



Tandbørstning

Det er vigtigt at holde munden ren. En uren mund giver større risiko for infektion i såret. Husk derfor at børste tænderne som sædvanligt, men pas på ikke at børste såret.

Hvad kan du spise?

Selvom du er generet af såret, skal du huske at spise. Spis gerne kold mad, der er blød eller flydende, den første dag.

Undgå at tygge i den side af munden, hvor tanden er fjernet, og spis ikke hård kost, så længe det er til besvær.

Rygning og alkohol

Sugeeffekten ved rygning kan tømme såret for den blodansamling, der er nødvendig for normal heling. Generelt forsinker rygning helingen af såret, så lad så vidt muligt være med at ryge.

Undgå alkohol i hvert fald det første døgn. Alkohol øger blodtilførslen til såret og kan give anledning til efterblødninger, som sinker sårets heling.

Efterblødning

Det er helt normalt, at der den første dag vil sive lidt blod fra såret. Det kan se værre ud, end det er, fordi blodet blander sig med spyttet.

Kommer der en regulær blødning, kan du bedst stoppe den ved at tage en ren tampon (fx et rent sammenrullet stykke gaze) og lægge direkte på såret (ikke ned i såret). Bid så sammen, så tamponen trykker på sårkanterne, og hold munden lukket i en halv time.



Det kan være nødvendigt at udskifte tamponen et par gange. Hvis blødningen stadig fortsætter, bør du kontakte din tandlæge. Kan det ikke lade sig gøre, skal du kontakte en anden tandlæge, læge eller skadestue.

Efterbehandling

Hvis det har været nødvendigt at sy efter fjernelse af tanden, skal trådene normalt fjernes af tandlægen efter fem-seks dage.

I sjældne tilfælde kan der komme betændelse i såret, så hullet efter tanden ikke lukker sig. En betændelse vil give smerter, dårlig ånde og dårlig smag i munden. Dette kræver efterbehandling hos tandlægen.

Kommer du i tvivl eller bliver usikker, skal du ringe til din tandlæge og få råd og svar på dine spørgsmål.

Denne brochure er et supplement til de oplysninger, som din tandlæge har givet dig.

Tandlæge:

Information fra
Tandlægeforeningen
Tlf. 70 25 77 11

Denne patientvejledning er udarbejdet af Tandlægeforeningen i samarbejde med Else Marie Pinholt, professor, dr.odont., Syddansk Universitet og Kæbekirurgisk afdeling, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg.

Copyright: Tandlægeforeningen

Oplag: 7.500
Revideret juni 2018